



Du jeudi 31 janvier au vendredi 1^{er} février 2019
Marseille

Table ronde IST PrEP

Guillaume Gras

CeGIDD 37 – COREVIH Centre Val de Loire - CHU Tours



Réévaluation de la stratégie de dépistage des infections à *Chlamydia trachomatis*

Septembre 2018

- **un dépistage opportuniste systématique des femmes sexuellement actives de 15 à 25 ans (inclus), y compris les femmes enceintes ;**
- **un dépistage opportuniste ciblé :**
 - ▶ des hommes sexuellement actifs présentant des facteurs de risque, quel que soit l'âge,
 - ▶ des femmes sexuellement actives de plus de 25 ans présentant des facteurs de risque,
 - ▶ des femmes enceintes consultant pour une IVG, sans limite d'âge.

Les facteurs de risque sont : multipartenariat (au moins deux partenaires dans l'année), changement de partenaire récent, individus ou partenaires diagnostiqués avec une autre IST (NG, syphilis, VIH, *Mycoplasma genitalium*), antécédents d'IST, HSH, personnes en situation de prostitution, après un viol.

Réévaluation de la stratégie de dépistage des
infections à *Chlamydia trachomatis*
Septembre 2018

- Chez la femme, l'échantillon vaginal est préféré au prélèvement urinaire
- Fréquence
 - 1/an si nouveau partenaire sans protection
 - Contrôle à 3 – 6 mois si dépistage positif
 - Tous les 3 mois chez HSH
- Auto-prélèvement = alternative au prélèvement et à considérer et proposer dans tous les lieux pour augmenter le taux de recours au dépistage

AVIS SUIVI DE RECOMMANDATIONS SUR LA NOTIFICATION FORMALISÉE AUX PARTENAIRES

ADOPTÉ PAR LE CNS LE 15 FÉVRIER 2018


Dispositif de dépistage VIH	Nb de tests réalisés (2016)	Proportion de tests positifs
Généraliste sérologies nominatives (Santé Publique France ³)	≈ 5,13 M	0,19 %
Spécifique sérologies anonymes	≈ 300 000	0,36 %
Ciblé TROD communautaires	≈ 56 339	0,87 %
Ultra-ciblé Notification au(x) partenaire(s) (données de la littérature ^{31,32})	<i>Non mis en œuvre en France</i>	12-86 %^a
C. trachomatis Dépistage systématique chez le(s) partenaire(s)		69 % ³³

^a Données colligées dans la littérature à partir de 17 articles

Suivi de l'utilisation de Truvada ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH

Période du 01/01/2016 au 30/06/2018

Novembre 2018




	Total
	N=10 405
Sexe, n (%)	
Hommes	10 164 (97,7)
Femmes	241 (2,3)
Age (années)*	
Moyenne (ET)	37,6 (10,3)
Ile-de-France	4 970 (47,8)


FIGURE I. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou générique pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2018, par mois

PrEPWatch


An initiative of 



PrEP Initiations by Country (April 2018)



Augmentation des IST aux Etats-Unis : pas que la PrEP





#VIHACK

48h pour défier le VIH

29 & 30 nov.

L'école ^{DU} web
ET DES réseaux



LECERCLEDIGITAL
édition - formation - communication